

Inyecciones

El propósito de la inyección deberá eliminar el dolor o entumecimiento sintiendo hormigueo causados por su condición. La inyección es una combinación de un anestésico local y una preparación de la cortisona. La solución de la cortisona disminuye la inflamación en el área implicada. El anestésico local causará el entumecimiento o la disminución temporarios en el dolor. El área para ser inyectada será lavada con un limpiador antiséptico. Una aguja pequeña se utilizará para inyectar la preparación. Usted se sentirá probablemente la plenitud en el sitio de inyección. Después que el anestésico se quita usted puede experimentar algún dolor durante unas pocas horas. Un lugar rojo pequeño se puede notar donde la aguja atravesó la piel. El dolor se puede manejar con hielo y/o Tylenol o con un antiinflamatorio si usted normalmente los puede utilizar.. El hielo se puede aplicar con una compresa de hielo. Una toalla se debe colocar entre la piel y el hielo. Usted puede utilizar también un cubito de hielo para frotar sobre el área adolorida. No salga el cubito de hielo en un lugar en la mano para cualquier plazo de tiempo. Usted debe llevar su tablilla tanto como posible para las próximas 24 horas. El dolor causado por la condición volverá después de los uso de anestésico de y antes de los trabajo de la cortisona. Por lo tanto sea preparado y utiliza las medicinas y la precaución que usted utilizó antes de la inyección. La inyección empezará a trabajar en aproximadamente 2 a 5 días. El beneficio repleto se notará en 3 semanas. La fiebre, el dolor severo, o la rojez podrían ser los signos de una infección. Si éstos se notan, usted debe llamar a su médico inmediatamente.

El Síndrome del Túnel Carpiano

El propósito de la inyección deberá eliminar el sentir hormigueo, el entumecimiento, y el dolor causado por el síndrome del túnel carpiano. La inyección se da en el lado de palmar de la muñeca donde lo encuentra el antebrazo. Después que la inyección, usted puede tener el entumecimiento en el pulgar, en el índice, en el centro, y en la parte del anular. Esto durará para acerca de una hora.

Tenosinovitis de DeQuervain

El propósito de la inyección deberá eliminar el dolor causado por Tenosinovitis de DeQuervain. La inyección estará en el lado de pulgar de la muñeca cerca de la base del pulgar. Usted debe llevar su tablilla de pulgar/muñeca tanto como posible para las próximas 24 horas.

Epicondylitis

El propósito de la inyección deberá eliminar el dolor causado por epicondylitis. El anestésico local utilizado disminuirá el dolor por aproximadamente una hora. Después que que el dolor volverá a ocurrir, así que sea preparado. La inyección se rendirá el área de la ternura máxima.

Provoque Dedo

El propósito de la inyección deberá eliminar el agarrar, cerrar, y el dolor causado por dedo de disparador. Después que la inyección, usted puede tener el entumecimiento en el dedo. Esto durará para acerca de una hora.

