



CENTER FOR OSSEOINTEGRATION
ORAL AND JAW RECONSTRUCTIVE SURGERY

Daniel I. Chin Jr., D.D.S. & Assoc., P.C.
Oral And Maxillofacial Surgeons

ST. ALEXIUS MEDICAL CENTER
1585 NORTH BARRINGTON ROAD
DOCTOR'S BUILDING TWO, SUITE 203
HOFFMAN ESTATES, IL 60169
(847) 843-0100

WATER TOWER PLACE
845 N. MICHIGAN AVENUE
SUITE 919E
CHICAGO, IL 60611
(312) 642-1252

術後指導

腔外科類似於身體的其他部位的外科手術。需要認真注意傷口的護理，以保證最佳的術後恢復。

請勿用舌頭或手指觸摸傷口

- 咬上紗布包，一小時換一次，直到出血停止

出血

- 少量滲血是手術後的正常現象，術後的几天都可能有少量的滲血
- 反 ▪ 出血應用紗布包控制，根據需要一個小時更換一次
- 為避免出血過多，按說明輕輕地咬上紗布包；在術後 24 小時之內，不要吸煙，吐痰，沖洗或用吸管喝飲料

疼痛

- 對於常規拔牙和口腔小手術，如有不適，請用推薦的非處方止痛藥（泰諾，布洛芬等）
- 對於更複雜的口腔手術，醫生將給您處方藥來控制不適；▪ 按照標籤說明服用
- 兒童：除非有處方藥，可用嬰兒/兒童泰諾/美林，根據 ▪ 明服用

腫脹

- 口腔手術後通常有些腫脹，特 ▪ 是 24-48 小時之內。為了盡量減少腫脹，術後 24 小時之內，醒著的時候，以半小時的時間間隔，用冰袋放在臉頰（手術側）。第一個 24 小時後，▪ 敷將有助於減少進一 ▪ 的膨脹。如果腫脹持續異常，請致電我們的辦公室，

飲食

- 術後第一個 24 小時內，不要吃或喝任何熱的食品飲料。第一兩天內建議食用軟食和大量的液體。在此之後，可以恢復正常的飲食

衛生

- 術後 24 小時後，可以恢復沖洗和刷牙。建議用 ▪ 鹽水漱口（半勺到 1 勺鹽加 8 盎司 ▪ 水）。

電話接聽服務 (847) 843-0100