



CENTER FOR OSSEOINTEGRATION
ORAL AND JAW RECONSTRUCTIVE SURGERY

Daniel I. Chin Jr., D.D.S. & Assoc., P.C.
Oral And Maxillofacial Surgeons

ST. ALEXIUS MEDICAL CENTER
1585 NORTH BARRINGTON ROAD
DOCTOR'S BUILDING TWO, SUITE 203
HOFFMAN ESTATES, IL 60169
(847) 843-0100

WATER TOWER PLACE
845 N. MICHIGAN AVENUE
SUITE 919E
CHICAGO, IL 60611
(312) 642-1252

INSTRUCCIONES PARA DESPUÉS DE LA OPERACIÓN

Una cirugía oral es similar a una cirugía realizada en otras partes de su cuerpo. Requiere una atención especial y el cuidado de las heridas para asegurarse un mínimo de complicaciones como consecuencia de la operación.

NO TOQUE O MOLESTE LA HERIDA CON SU LENGUA O DEDOS.

- Muerda un pedazo de gaza por una hora a la vez sin cambiar la gaza hasta que la sangre deje de fluir.

SANGRAMIENTO

- El sangramiento de la herida es normal después de una cirugía y ésta puede seguir sangrando en cantidades menores por los primeros días.
- El sangramiento recurrente puede ser controlado reemplazando el pedazo de gaza con intervalos de una hora si usted lo considera necesario.
- Para evitar sangramiento excesivo, muerda delicadamente el pedazo de gaza como se le indicó; NO FUME, escupa, lave ó tome nada a través de un popote ó pitillo por las primeras 24 horas.

DOLOR

- Para una extracción usual de los dientes y una cirugía menor, por favor tome los analgésicos que venden en las farmacias (Tylenol, Advil, etc.) como se le indicó para aliviar el malestar.
- Para cirugías orales más complicadas, se le dará una medicina de prescripción para aliviar el malestar; siga las instrucciones indicadas en la medicina.
- **Niños:** A menos que se le haya dado una medicina de prescripción, use Tylenol para Bebés/Niños ó Motrin de acuerdo a las instrucciones.

HINCHAZÓN

- Una hinchazón puede aparecer luego de una cirugía oral y puede agravarse las primeras 24-48 horas. Para minimizar esto aplique una bolsa de hielo sobre el cachete (en el lado de la cirugía) por intervalos de media hora durante las primeras 24 horas. Luego de las 24 horas, unas compresas tibias lo ayudarán a resolver cualquier hinchazón futura. Por favor llame a nuestra oficina si la hinchazón persiste más del tiempo normal.

DIETA

- Nada caliente de comer ó beber por las primeras 24 horas. Una dieta delicada con muchísimo líquido es recomendada preferiblemente para el primer o los dos días después de la cirugía. Luego, se recomienda una dieta normal.

HIGIENE

- Puede enjuagarse y cepillarse luego de las 24 horas. Se recomienda lavarse y hacer enjuagues con agua tibia con sal (una 1/2 a 1 cucharada de sal mezclada con un vaso de agua de 8 onzas).

SERVICIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS (847) 843-0100